

L-Amino +[®] B

**Biostymulujący nawóz
organiczno-mineralny**

Do stosowania dolistnego i dokorzeniowego

- w uprawach konwencjonalnych
- w uprawach ekologicznych

**SZYBKO
PRZYSWAJALNY
BOR (B)**

**CERTYFIKAT
EKOLOGICZNY
NE/565/2021
IUNG**

**Biologicznie aktywne
L-α WOLNE AMINOKWASY
Z HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ**

HISTYDYNA	SERYNA	ARGININA	GLICYNA	KWAS ASPARAGINOWY	KWAS GLUTAMINOWY	
TREONINA	ALANINA	PROLINA	CYSTEINA	LIZYNA	TYROZYNA	METIONINA
WALINA	IZOLEUCYNA	LEUCYNA	FENYLOALANINA	TRYPTOFAN		

**Zawiera
18 naturalnych
aminokwasów L-α
z hydrolizy enzymatycznej**
Marka PREMIUM



SZYBKO PRZYSWAJALNY Bor (B)

L-Amino+® B

z NATURALNYMI L-α aminokwasami

L-Amino+® B Aminokwasy Naturalne do profesjonalnych zastosowań

- Specjalistyczny środek do zapobiegania i korekty niedoborów boru (B) z technologią L-Amino+®.
- Zawiera bor (B) w formie szybko i łatwo przyswajalnej przez rośliny oraz biologicznie aktywne naturalne wolne L-α aminokwasy powstałe z hydrolizy enzymatycznej.

ZAPEWNIĄ:

- łatwe i szybkie dostarczenie boru do wnętrza tkanek
- prawidłowy wzrost organów generatywnych
- lepsze kwitnienie i owocowanie

Zastosowanie unikalnej technologii produkcji L-Amino+® B zapewnia szybkie dostarczenie boru oraz aminokwasów do najbardziej potrzebujących miejsc w roślinie oraz jego maksymalne wykorzystanie poprzez łatwą transpirację do tkanek dzięki naturalnym biologicznie aktywnym aminokwasom L-α.

Dawkі, terminy i sposób stosowania

Uprawa	Stosowanie	Dawka l/ha (jednorazowo)	Stężenie %	Ilość cieczy roboczej l/ha	Termin
Jabłko, Grusza	Dolistne		0,2-0,3% (200-300 ml nawozu w 100 l wody)	300-750	Wykonać łącznie 4-6 zabiegów: - 1-2 od fazy silowego/białego pąka do początku kwitnienia, - 2-3 po opadnięciu płatków kwiatowych, - 1 bezpośrednio po zbiorach owoców.
Winogro, Czeresnia, Śliwa, Brzoskwinia, Morela, Nektarynka	Dolistne		0,2-0,3% (200-300 ml nawozu w 100 l wody)	300-750	Wykonać łącznie 3-4 zabiegów: - 1-2 od fazy białego pąka do początku kwitnienia, - 1 po opadnięciu płatków kwiatowych, - 1 bezpośrednio po zbiorach owoców.
	Dokorzeniowo	4-6 Łączna dawka nawozu w całym sezonie 40 l/ha.			Wykonać zabiegi co 7-14 dni do końca kwitnienia do początku zbioru owoców.
Truskawka	Dolistne		0,2-0,3% (200-300 ml nawozu w 100 l wody)	300-600	Wykonać 2 zabiegi w okresie od pojawienia się pierwszych liści do początku kwitnienia.
Winorośl	Dolistne		0,2-0,3% (200-300 ml nawozu w 100 l wody)	300-750	Wykonać łącznie 1-2 zabiegi: - 1 przed kwitnieniem, - 1 po pojawieniu się owoców.
Pozostałe rośliny jagodowe	Dolistne		0,2-0,3% (200-300 ml nawozu w 100 l wody)	300-600	Wykonać łącznie 4-5 zabiegów: - 2-3 w odstępach co 7-10 dni od pojawienia się pierwszych liści do zakończenia kwitnienia, - 1 zabieg wykonać bezpośrednio po zbiorach.
	Dokorzeniowo	4-6 Łączna dawka nawozu w całym sezonie 40 l/ha.			Wykonać zabiegi co 7-14 dni do końca kwitnienia do początku zbioru owoców przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniania.
Pomidór, Papryka, Bakłażan	Dolistne		0,2-0,3% (200-300 ml nawozu w 100 l wody)	300-500	Wykonać 1-2 zabiegi podczas kwitnienia.
Kalafior, Brokuł	Dolistne		0,2-0,3% (200-300 ml nawozu w 100 l wody)	300-500	Wykonać 1-2 zabiegi w fazie formowania rąb.
Cebula, czosnek	Dolistne		0,2-0,3% (200-300 ml nawozu w 100 l wody)	300-500	Wykonać 1-2 zabiegi od fazy 3-5 liści do początku wiązania główki.
Opiekie	Dolistne		0,2-0,3% (200-300 ml nawozu w 100 l wody)	300-500	Wykonać 1-2 zabiegi przed kwitnieniem.
Marchew, Pieprzowa, Burak cukrowy	Dolistne		0,2-0,3% (200-300 ml nawozu w 100 l wody)	300-500	Wykonać 2 zabiegi: - 1 w fazie grubienia korzenia, - 1 w fazie intensywnego wzrostu korzenia.
	Dolistne		0,2-0,3% (200-300 ml nawozu w 100 l wody)	300-500	Wykonać 2-3 zabiegi od początku kwitnienia.
Ziemniak	Dokorzeniowo	4-6 Łączna dawka nawozu w całym sezonie 40 l/ha.			Zabiegi wykonać co 7-15 dni podczas wegetacji przy zastosowaniu odpowiednich systemów nawadniania.

Instrukcja stosowania i przechowywania nawozu:

Skład:

Wolne aminokwasy.....	5,00% (m/m)
Bor (B)	5,00% (m/m)
Azot całkowity (N)	3,00% (m/m)
Postać	plynny, roztwór

Sposób sporządzania cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzając ilość nawozu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego czystą wodą (z wyłączeniem mieszań), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie umyć.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od 0°C do +30°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od dzieci, zwierząt i żywności.

Środki ostrożności

Podczas prac z nawozem używać odzieży ochronnej, okularów i rękawic gumowych. W przypadku dostania się nawozu do oczu przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza. Po pracy umyć ręce wodą z mydłem.

Uwaga

- Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł, dla uprawy w plonie głównym (N w kg/ha) dla plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem (NPK) i stosowania integrowanej ochrony roślin powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Programu azotanowego;
- Zabrania się stosowania nawozu na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem. Za gleby zamarznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia;
- Nie przewiduje się stosowania nawozu łącznie ze środkami ochrony roślin.

Zakres stosowania

Nawóz organiczno-mineralny „L-Amino+ B Aminokwasy Naturalne do profesjonalnych zastosowań” zawierający w swoim składzie naturalne wolne L-α aminokwasy może być stosowany w uprawie roślin warzywnych i sadowniczych. Nawóz organiczno-mineralny „L-Amino+® B Aminokwasy Naturalne do profesjonalnych zastosowań” polecany jest do stosowania dolistnego i dogłębowego, w tym fertygacji.

**NAWÓZ ZAKWALIFIKOWANY DO STOSOWANIA W ROLNICTWIE
EKOLOGICZNYM ŚWIADECTWEM KWALIFIKACJI IUNG NR NE/565/2021**